Начальный вариант

НАИБОЛЬШИЙ ОБЩИЙ ДЕЛИТЕЛЬ

АР 4
26.10
1987г

Пусть a и b — целые числа, не равные нулю одновременно. Наибольшее число, делящее как a так и b, называется их НАИБОЛЬШИМ ОБЩИМ ДЕЛИТЕЛЕМ и обозначается НОД(a,b). Числа a и b называются ВЗАИМНО ПРОСТЫМИ, если НОД(a,b)=1 , т.е. у них нет общих делителей кроме ±1.

1. Найдите НОД следующих чисел (m и n — натуральные): а) n и n+1 ; б) n и n+6 ; в) n+2 и 3n+5 ; г) 2n+3 и 7n+6 ; д) 2n+1 и n^2 ; е) 2^n-1 и 2^m-1 ; ж) $2^{2^n}+1$ и $2^{2^m}+1$.

2. Докажите, что а) если НОД(a,b)=d, то a/d и b/d взаимно просты ; б) НОД(a,ab)=a (a>0) ; в) НОД(b,a−b)=НОД(a,b); г) НОД(b,a−kb)=НОД(a,b); д) НОД(13a+10b,9a+7b)=НОД(a,b). е) Найдите НОД(4731,2109). ж)* НОД(ka+1b,ma+nb)=НОД(a,b) , если kn−1m = 1.

Подмножество I кольца M называется ИДЕАЛОМ , если выполнены два условия: (И1) $a,b \in I \Rightarrow a+b \in I$ и (И2) $a \in I$ и $n \in M \Rightarrow na \in I$.

3. Какие из следующих множеств являются идеалами а) {0} б) $\mathbb{Z}$ в) $\mathbb{N}$ г) $k\mathbb{Z} := \{x \mid x \vdots k\}$ д) $\{x \mid x \vdots 3$ или $x \vdots 5\}$ е) $\{ax+by \mid x,y \in \mathbb{Z}\}$ ж) $\{x \mid xb \vdots c\}$??

4(Теорема о ГЛАВНЫХ ИДЕАЛАХ). Докажите, что любой идеал кольца $\mathbb{Z}$ имеет вид задачи 3г, т.е. совпадает с множеством кратных некоторого числа k (это число называется ОБРАЗУЮЩЕЙ идеала)
/Указание: рассмотрите наименьший положительный элемент идеала/.

5(НОД и идеалы). Докажите, что а) образующая идеала 3е = НОД(a,b); в) НОД(a,b) делится на любой общий делитель чисел a и b ; в) если a и b взаимно просты, то найдутся x,y , такие что ax+by=1; г)* любое число представляется в виде ax+by+cz , если a,b,c не имеют общего делителя отличного от ±1.

6(Теоретические следствия). Пусть b и c взаимно просты, p — простое. Тогда а) $ab \vdots c \Rightarrow a \vdots c$; б) $ab \vdots p \Rightarrow$ a или b кратно p; в) $a \vdots b$ и $a \vdots c \Rightarrow a \vdots bc$.

Теперь уже ничего не стоит доказать основную теорему арифметики, но мы с этим немного повременим.

7. Докажите, что а) НОД(ka,kb)=k·НОД(a,b) ; б) НОД(a,b)·НОК(a,b)=|ab| где НОК(a,b) — наименьшее общее (положительное) кратное чисел a и b.

8(Линейные ДИОФАНТОВЫ УРАВНЕНИЯ). Рассмотрим уравнение ax+by=c Докажите что а) оно имеет решение в целых числах .титтк c⋮d=НОД(a,b); б) если x_0, y_0 одно из его решений, то все решения даются формулами
$x = x_0 + tb/d$, $y = y_0 - ta/d$, $t \in \mathbb{Z}$.
Найдите все решения уравнений в) 29x−13y=1 ; г) 29x−13y=2 .

9. Слонопотам за один ход на бесконечной шахматной доске перемещается на m клеток в одном направлении и на n в перпендикулярном. (Конь — это слонопотам с m=2,n=1.) При каких m,n слонопотам может попасть на соседнее с ним поле?

10(КИТАЙСКАЯ ТЕОРЕМА ОБ ОСТАТКАХ). Пусть натуральные числа $m_1,\dots,m_k$ попарно взаимно просты, а $r_1,r_2,\dots,r_k$ произвольные целые. Докажите, что а) $\exists n \in \mathbb{N}\ \forall i \quad n \equiv r_i \pmod{m_i}$; б) такое n от 1 до $m_1 m_2 \dots m_k$ ровно одно.

1аб	в	г	д	е	ж	2аб	в	г	д	е	ж*	3аб	в	г	д	е	ж	4	5авг*	6авв	7аб	8авг	9	10аб
12 нояб	26н	29н	3д			12 нояб					16д	12 нояб						19н	26 нояб	29н	2дк	3д	26н	29н
Ивеев	Ив	Ив	Ив			Алеев →					Ав	Алеев →						Ав	Ал →	Ив	Ив	Ив	Ив	Ив