Математика.

О некоторых экстремальных прямых

Ипатова Виктория, 10 физико-математический класс
ГБОУ «Химический лицей № 1303», город Москва
Научный руководитель: Привалов Александр Андреевич, МПГУ, доцент, к.ф.-м.н.

Пусть имеется n точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($n>2$) на плоскости. Требуется

1. Найти прямую l, с наименьшей суммой расстояний до этих точек, т.е. такую, что
$$\sum_{i=1}^{n} r(A_i, l) \le \sum_{i=1}^{n} r(A_i, l_1), \forall\, l_1,$$
где $r(A,l)$ – расстояние от точки A до прямой, l_1 – произвольная прямая на плоскости.

2. Найти прямую l, наименее уклоняющуюся от этих точек, т.е. такую, что
$$\max_{1\le i\le n} r(A_i, l) \le \max_{1\le i\le n} r(A_i, l_1), \forall\, l_1,$$

3. Найти прямую l, с наименьшей суммой квадратов расстояний до этих точек, т.е. такую, что
$$\sum_{i=1}^{n} r^2(A_i, l) \le \sum_{i=1}^{n} r^2(A_i, l_1), \forall\, l_1.$$

Запишем уравнение произвольной прямой l :

$$ax + by + c = 0,$$

Тогда расстояние от точки $A(x_0,y_0)$ до l равно:

$$r(A,l) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Для удобства, будем искать уравнение прямой в виде:

$$y\cos\alpha - x\sin\alpha + c = 0 \qquad (1)$$

где α – угол образованной прямой с осью абсцисс (Ox), c – некоторое число и наши задачи сводятся к минимизации функций

$$S_1 = S_1(\alpha, c) = \sum_{i=1}^{n} | y_i\cos\alpha - x_i\sin\alpha + c |,$$
$$S_\infty = S_\infty(\alpha, c) = \max_{1\le i\le n} | y_i\cos\alpha - x_i\sin\alpha + c |, \qquad (*)$$
$$S_2 = S_2(\alpha, c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i\cos\alpha - x_i\sin\alpha + c)^2,$$

где (x_i,y_i) – координаты точек $A_i(x_i,y_i)$, i=1,…n.

deg. ***Норма*** — функционал, заданный на векторном пространстве и обобщающий понятие длины вектора или абсолютного значения числа.

Очевидно, что функции (*) непрерывны по переменным α и c, поэтому задачи 1 – 3 имеют решения. Прямая l – решение первой задачи, является *наименее уклоняющейся* от точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ прямой в $\boldsymbol{l}_1$-метрике (по норме пространства $\boldsymbol{l}_1$). решением задачи 3 является прямая *наименее уклоняющейся* от точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ в $\boldsymbol{l}_2$-метрике (по норме пространства $\boldsymbol{l}_2$ или евклидовой метрике). И, наконец, решение второй задачи – *наименее уклоняющейся* от точек

$A_1, A_2, \ldots, A_n$ прямой в равномерной метрике ($\boldsymbol{l}_\infty$-метрике или по норме пространства $\boldsymbol{l}_\infty$ или пространства $\boldsymbol{m}$).

Напомним, $\boldsymbol{l}_p$ ($p \geq 1$) – множество всех линейное пространство последовательностей

$z = (z_1, z_2, \ldots)$ с нормой $\| z \|_p = \left(\sum_j | z_j |^p \right)^{\frac{1}{p}}$, если $p=\infty$, то $\boldsymbol{l}_\infty$ – множество всех ограниченных последовательностей – линейное пространство с нормой $\| z \| = \| z \|_\infty = \max_j | z_j |$ (*равномерная* норма) .

Рассмотрим ***1 задачу***

Теорема 1.

Среди любых различных точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ плоскости существуют такие две точки, что для прямой l, проходящей через них, и любой другой прямой l_1 на плоскости, сумма расстояний от l до точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ не больше суммы расстояний от l_1 до точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$, т.е.

$$\sum_{i=1}^{n} r(A_i, l) \leq \sum_{i=1}^{n} r(A_i, l_1), \forall\, l_1$$

Доказательство:

Введем координаты точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$: $A_i(x_i,y_i)$, $i=1,\ldots n$.. Тогда задача сводится к нахождению прямой l, при которой функция

$$S_1(\alpha, c, l) = \sum_{i=1}^{n} \rho(l, A_i) = \sum_{i=1}^{n} \left| y_i \cos\alpha - x_i \sin\alpha + c \right| \qquad (2)$$

принимает минимальное значение. Эта функция двух переменных является непрерывной и ограниченной, значит, по теореме Вейерштрасса достигает своего минимального значения. То есть задача разрешима.

Пусть l – искомая прямая, т.е. $S_1(\alpha, c, l_1) \geq S_1(\alpha, c, l)$ (2) для любой прямой l_1. Обозначим $S_1(\alpha, c, l) = S_0$

Докажем, что тогда прямая будет содержать по крайней мере одну точку из $A_1, A_2, \ldots, A_n$.

Введем систему координат так, чтобы ось абсцисс совпадала с прямой l, ось ординат вдоль нормали к прямой l и центр совпадал с точкой (x_1,y_1). Очевидно, что некоторые из точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ лежат над прямой l, а некоторые под l (в противном случае l не наилучшая прямая).

$$S_0 = \sum_{+} y_i - \sum_{-} y_j \qquad (3)$$

где $\sum_{+} y_i$ сумма точек, лежащих выше координатной прямой, а $\sum_{-} y_j$ ниже

Предположим, что ни одна из точек $A_1, \ldots, A_n$ не лежит на l, т.е. на оси абсцисс. Докажем, что тогда наилучшее приближение S_0 можно уменьшить вращением прямой l вокруг начала координат (0,0) :

$$\sum_{i=2}^{n}\rho(l,A_i)=\sum_{i=2}^{n}\left|y_i\cos\alpha-x_i\sin\alpha\right|=\cos\alpha\left(\sum_{+}y_i-\sum_{-}y_j\right)-\sin\alpha\left(\sum_{+}x_i-\sum_{-}x_j\right)=S_0\cos\alpha-S_1\sin\alpha$$

Где $S_1=\sum_{+}x_i-\sum_{-}x_j$. Теперь, если S_1 меньше нуля, то повернем l по часовой стрелки ($\alpha<0$); если это выражение неотрицательно, то – против часовой стрелки ($\alpha>0$); если же $S_1=0$, то крутим в любую сторону. Как не сложно видеть во всех случаях $S_1(\alpha,0)$ будет меньше S_0. Неравенство (2) нарушится и следовательно прямая будет содержать по крайней мере одну точку из $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Пусть это точка A_1. Предположим, что l не содержит ни одной точки множества $\{A_2, \ldots, A_n\}$.

Введем систему координат с осью абсцисс, совпадающей с прямой l и началом в точке A_1. Тогда в этой системе координат все точки $A_2, \ldots, A_n$ будут иметь не нулевые ординаты. Повторяя предыдущие рассуждения, докажем существования точки множества $\{A_2, \ldots, A_n\}$ и прямой l. Теорема доказана.





Рассуждая аналогично мы можем прийти к решению нашей второй задачи. А именно, доказать следующую теорему.

Задача 2

Теорема 2.

Среди любых различных точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ плоскости существуют такие три точки A, B, C, что наименее уклоняющаяся от $A_1, A_2, \ldots, A_n$ прямая l такая, что

$$\max_{1\le i\le n} r(A_i,l)\le \max_{1\le i\le n} r(A_i,l_1),\ \forall\, l_1,$$

содержит среднюю линию треугольника ABC.

Доказательство.

Пусть l – наилучшая прямая и

$$s_0=\max_{1\le i\le n} r(A_i,l)\le \max_{1\le i\le n} r(A_i,l_1),\quad \forall l_1. \qquad (*1)$$

Для удобства изложения, представим себе, что эта прямая горизонтальная.

Понятно, что найдется точка, например, A_1 такая, что $s_0 = r(A_1,l)$. Если других таких точек не существует, т.е. $r(A_i,l) < s_0$, $i = 2, 3, \ldots, n$, то небольшим параллельным сдвигом прямой l к точке A_1 получим прямую l_1, не удовлетворяющую $(*1)$. Значит существует две точки, пусть A_1 и A_2 такие, что $s_0 = r(A_1,l) = r(A_2,l)$. Если эти точки находятся по одну сторону от прямой и если при этом других таких точек не существует, то небольшим параллельным сдвигом прямой l к точке A_1 получим прямую l_1, не удовлетворяющую $(*1)$. Если эти точки находятся по разные стороны и если при этом других таких точек не существует, то небольшим поворотом вокруг точки $B = \dfrac{A_1 + A_2}{2}$, получим прямую l_1, также не удовлетворяющую неравенству $(*1)$. То же самое произойдет для трех точек (пусть A_1, A_2 и A_3, $s_0 = r(A_1,l) = r(A_2,l) = r(A_3,l)$ и $r(A_i,l) < s_0$, $i = 3, \ldots, n$), из которых две (A_1 и A_2) лежат над (под) прямой l, а третья A_3 – под l и правее A_1 и A_2 (в этом случае поворот вокруг $B = \dfrac{A_1 + A_3}{2}$ или $B = \dfrac{A_2 + A_3}{2}$).

Следовательно, найдутся три точки, например, A_1, A_2 и A_3, что $s_0 = r(A_1,l) = r(A_2,l) = r(A_3,l)$ и расположены они попеременно над и под прямой l. Не сложно видеть, что эта прямая проходит через среднюю линию треугольника $A_1A_2A_3$. Теорема доказана.





Задача 3

Теорема 3.

Среди любых различных точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ плоскости существует такая прямая l, что для любой другой прямой l_1, сумма квадратов расстояний от l до точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ не больше суммы квадратов расстояний от l_1 до точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$, т.е.

$$\sum_{i=1}^{n} r^2(A_i,l) \le \sum_{i=1}^{n} r^2(A_i,l_1), \forall\, l_1,$$

при этом $M \in l$, где M – центр масс $\left(\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{MA_i} = \vec{0}\right)$.

Доказательство.

Поскольку функция $S(\alpha,c)$ непрерывно дифференцируемая функция, поэтому в точке минимума ее частные производные обращаются в ноль. Найдем производную по переменной c и, приравняв ее к нулю, получим:

$$\begin{cases} S(c)' = 0 \\ S(\alpha)' = 0 \end{cases} \Rightarrow 2\sum_{i=1}^{n}(y_i\cos\alpha - x_i\sin\alpha + c) = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{\cos\alpha}{n}\sum y_i + \frac{\sin\alpha}{n}\sum x_i$$

Уравнение сводится к виду:

$$(y - y_c)\cos\alpha - (x - x_c)\sin\alpha + c = 0$$

где $x_c = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ и $y_c = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$ координаты центра масс системы точек $A_1, A_2,\ldots,A_n$ с единичными массами.

Без потери общности, можно считать, начало координат совпадает с этим барицентром системы точек $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$, тогда c=0,

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i = 0 \qquad (4)$$

и нашей задачей будет исследовать на экстремум функцию одной переменной $S(\alpha, 0)$.

$$S(\alpha,0) = \sum(y_i\cos\alpha - x_i\sin\alpha)^2$$

Приравнивая к нулю ее производную, получим,

$$S'(\alpha,0) = -2\sum_{i=1}^{n}(y_i\cos\alpha - x_i\sin\alpha)(y_i\sin\alpha + x_i\cos\alpha) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \cos\alpha\sin\alpha\sum_{i=1}^{n}(x_i^2 - y_i^2) = 0$$

Обозначая в последнем равенстве $G = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ и $F = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i^2 - y_i^2)$, придем к тригонометрическому уравнению:

$$G\cos 2\alpha = F\sin 2\alpha$$

Если F=G = 0, это уравнение имеет бесконечно много решений и, значит, решением нашей задачи будет любая прямая, проходящая через центр масс системы точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ с единичными массами.

Если же ни одно из чисел F или G не равно нулю, то приходим к двум решениям:

$$\begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{2}arctg\frac{G}{F} \\ \alpha_2 = \frac{1}{2}arctg\frac{G}{F} + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Далее, так как функция ($G\cos 2\alpha = F\sin 2\alpha$) π-периодическая, одно из найденных решений будет точкой максимума функции $S(\alpha,0)$, а другое – точкой минимума.

Последние рассуждения приводят нас к следующей задаче:

Пусть имеется n точек $A_1, \ldots, A_n$, (n>2) на плоскости. Требуется найти такую точку $P(x_0, y_0)$, сумма квадратов расстояний от точек $A_1, \ldots, A_n$ до любой прямой будет постоянной (не зависящей от l) величиной.

Теорема 4.

Для любых точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ на плоскости существуют ровно две, не обязательно различных, точки P_1 и P_2 такие, что сумма квадратов расстояний от любой прямой, проходящей через P_1 или P_2, до точек $A_1, A_2, \ldots, A_n$ будет постоянной величиной, не зависящей от угла, т.е.

$$\forall l : P_j \in l \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} r^2(A_i, l) = const,\ j = 1,2$$

причем точки P_1 и P_2 симметричны относительно центра масс M.

Доказательство.

С помощью преобразования (переноса) введем новую систему координат (U,V) такую, что

$$\begin{cases} U = x\cos\alpha - y\sin\alpha \\ V = x\sin\alpha + y\cos\alpha \end{cases}$$

В новой системе координат (обозначим ее так же через x и y для упрощения) произведем поворот на угол α, чтобы в новой системе $U \cdot V = \sum x_i y_i = 0$, т.е.

$$\alpha = \frac{1}{2} arcctg\left(\frac{1}{2}\frac{\sum (y_i^2 - x_i^2)}{\sum x_i y_i}\right)$$

Где $\sum x_i y_i \neq 0$, следовательно, при $\sum x_i y_i = 0$ $\alpha = \frac{\pi}{2}$

Пусть $A_i(x_i,y_i)$, i=1,…n, – точки плоскости. В виду постановки задачи без потери общности можно считать, что центр масс этих точек лежит в начале координат, т.е. имеют место равенства $\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i = 0, \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 0$

Далее, пусть $P(x_0,y_0)$ – искомая точка, тогда сумму квадратов расстояний от точек $A_i(x_i,y_i)$, i=1,…n, до произвольной прямой, проходящей через P равно

$$S(\delta) = \sum_{i=1}^{n} ((x_i - x_0)\cos\delta + (y_i - y_0)\sin\delta)^2$$

Открывая скобки и пользуясь формулами: $2\sin\delta\cos\delta = \sin 2\delta, 2\cos^2\delta = 1 + \cos 2\delta$, и $2\sin^2\delta = 1 - \cos 2\delta$, получаем:

$$S(\delta) = S_0 + S_1(\delta)$$

где S_0 – величина, не зависящая от δ:

$$S_0 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left((x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2\right),$$

а $S_1(\delta)$ – тригонометрический полином $F\cos 2\delta + G\sin 2\delta$ с коэффициентами:

$$F = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i - x_0)^2 - \sum_{i=1}^{n}(y_i - y_0)^2\right)$$

$$G = \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_0)(y_i - y_0)$$

По условию задачи искомая точка $P(x_0,y_0)$ должна быть такой, чтобы функция $S(\delta)$ не зависела от δ. Ввиду независимости функций $\cos 2\delta$ и $\sin 2\delta$ величина $S_1(\delta)$ будет равной нулю только в том случае, когда F и G равны нулю. То есть приходим к системе из двух уравнений с двумя неизвестными x_0 и y_0:

$$\begin{cases} F = 0 \\ G = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_0)^2 = \sum_{i=1}^{n}(y_i - y_0)^2 \\ \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_0)(y_i - y_0) = 0 \end{cases} \qquad (5)$$

Пользуясь формулами (4) уравнения этой системы легко преобразовать, например, так

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - x_0)(y_i - y_0) = \sum_{i=1}^{n}x_i y_i - \sum_{i=1}^{n}x_i y_0 - \sum_{i=1}^{n}y_i x_0 + \sum_{i=1}^{n}y_0 x_0 = \sum_{i=1}^{n}x_i y_i + n y_0 x_0$$

и в итоге получить систему

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n}x_i^2 + n x_0^2 = \sum_{i=1}^{n}y_i^2 + n y_0^2 \\ \sum_{i=1}^{n}x_i y_i = -n x_0 y_0 = 0 \end{cases} \qquad (6)$$

Отсюда имеем:

1. Если $\sum_{i=1}^{n}x_i^2 = \sum_{i=1}^{n}y_i^2$, то решением задачи будет единственная точка (0,0) – центр масс системы $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$.
2. Если x_0=0 или y_0=0. Тогда из первого уравнения системы следует, что если $\sum_{i=1}^{n}x_i^2 \le \sum_{i=1}^{n}y_i^2$, то y_0=0 и решением задачи будут точки $P_{1,2}\left(\pm\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i^2 - x_i^2)}, 0\right)$ или $P_{1,2}\left(0, \pm\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i^2 - y_i^2)}\right)$ – в противном случае. Очевидно, что эти точки симметричны относительно (0,0).

Теорема доказана.

Рассмотрим задачу о том как могут располагаться точки $A_1, A_2, \ldots, A_n$ плоскости относительно друг друга. Для этого приведем следующую полезную лемму, доказательство которой следует из системы (5):

Лемма.

Точка $P(x_0, y_0)$является решением задачи для точки $A_1(x_1, y_1), A_2(x_2, y_2),..., A_n(x_n, y_n)$

в том и только в том случае, если векторы

$$\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} x_1 - x_0 \\ x_2 - x_0 \\ \dots \\ x_n - x_0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} y_1 - y_0 \\ y_2 - y_0 \\ \dots \\ y_n - y_0 \end{pmatrix}$$ ортогональны и имеют равные длины.

Из леммы следует, что если точки A_1, A_2, …, A_n являются вершинами правильного многоугольника, то решением задачи будет центр масс этих точек. Тогда можно считать, что точки A_1, A_2, …, A_n имеют координаты:

$A_{j+1}\left(\cos\left(\frac{2\pi j}{n}\right), \sin\left(\frac{2\pi j}{n}\right)\right)$, $j = 0,1,...,n-1$. Тогда, т.к. при $n>2$

$\sum_{j=0}^{n-1} e^{\frac{4\pi i j}{n}} = \sum_{j=0}^{n-1} \cos\left(\frac{4\pi j}{n}\right) + i\sum_{j=0}^{n-1} \sin\left(\frac{4\pi j}{n}\right) = 0$ (i – мнимая единица), то

$$\sum_{j=0}^{n-1} \cos^2\left(\frac{2\pi j}{n}\right) = \frac{n}{2} + \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1} \cos\left(\frac{4\pi j}{n}\right) = \frac{n}{2}, \quad \sum_{j=0}^{n-1} \sin^2\left(\frac{2\pi j}{n}\right) = \frac{n}{2} - \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1} \cos\left(\frac{4\pi j}{n}\right) = \frac{n}{2}$$

и $$\sum_{j=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2\pi j}{n}\right)\sin\left(\frac{2\pi j}{n}\right) = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1} \sin\left(\frac{4\pi j}{n}\right) = 0$$

Отсюда и леммы следует, что $P(0,0)$ – решение задачи.

В случае $n=3$ верно и обратное утверждение.

Теорема 5.

Если в теореме 4 для точек A_1, A_2, A_3 точки P_1 и P_2 совпадают ($P_1=P_2$), то треугольник $A_1A_2A_3$ правильный.

Доказательство.

Введем систему координат Oxy так, чтобы точка $P(0,0)$ была решением задачи для точек A, B, C. Пусть $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ и $C(x_3,y_3)$ – вершины треугольника ABC.

Так как $P(0,0)$ – решение задачи, то в силу леммы векторы $\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ и $\boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$

перпендикулярны и имеют равные длины.

Так как $P(0,0)$ точек A, B, C, то $x_1+x_2+x_3=y_1+y_2+y_3=0$, значит векторы $\boldsymbol{f}$ и $\boldsymbol{g}$ перпендикулярны вектору $\boldsymbol{e}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ ($\boldsymbol{fe}=0$ и т.к. $\boldsymbol{ge}=0$) т.е. координаты векторов $\boldsymbol{f}$ и $\boldsymbol{g}$ лежат в плоскости $x+y+z=0$. Найдем все такие векторы.

Выберем два произвольных ортогональных вектора $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ с равными длинами и перпендикулярными вектору $\boldsymbol{e}$, например, $\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ и $\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\-\sqrt{3}\\0\end{pmatrix}$

Матрицей перехода от стандартного базиса ($\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$) трехмерного пространства к ортогональному базису ($\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}$) является матрица

$$\Psi=\begin{pmatrix}1 & \sqrt{3} & 1\\ 1 & -\sqrt{3} & 1\\ -2 & 0 & 1\end{pmatrix} \qquad (7)$$

Семейство ортогональных единичных векторов $\boldsymbol{a}=\begin{pmatrix}\cos t\\ \sin t\\ 0\end{pmatrix}$ и $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}-\sin t\\ \cos t\\ 0\end{pmatrix}$, где ($0\le t\le 2\pi$), описывает все пары векторов перпендикулярных вектору $\boldsymbol{k}$. Поэтому (с точностью до множителя) семейство искомых векторов $\boldsymbol{f}$ и $\boldsymbol{g}$ находим с помощью матрицы (7)

$$\boldsymbol{f}=\Psi\boldsymbol{a}=\begin{pmatrix}\cos t+\sqrt{3}\sin t\\ \cos t-\sqrt{3}\sin t\\ -2\cos t\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}\cos\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\\ \cos\left(t+\frac{\pi}{3}\right)\\ -\cos t\end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \boldsymbol{g}=\Psi\boldsymbol{b}=2\begin{pmatrix}\cos\left(t+\frac{\pi}{6}\right)\\ -\cos\left(t-\frac{\pi}{6}\right)\\ \sin t\end{pmatrix}$$

Отсюда и леммы координаты вершин треугольника ABC можно принять как

$$A\left(\cos\left(t-\frac{\pi}{3}\right),\cos\left(t+\frac{\pi}{6}\right)\right),\ B\left(\cos\left(t+\frac{\pi}{3}\right),-\cos\left(t-\frac{\pi}{6}\right)\right),\ \text{и}\ C(-\cos t,\sin t)$$

Найдем длины сторон этого треугольника:

$$|AB|^2=\left(\cos\left(t-\frac{\pi}{3}\right)-\cos\left(t+\frac{\pi}{3}\right)\right)^2+\left(\cos\left(t+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(t-\frac{\pi}{6}\right)\right)^2=4\sin^2 t\sin^2\frac{\pi}{3}+$$

$$+4\cos^2 t\cos^2\frac{\pi}{6}=3$$

$$|AC|^2=\left(\cos\left(t-\frac{\pi}{3}\right)+\cos t\right)^2+\left(\cos\left(t+\frac{\pi}{6}\right)-\sin t\right)^2=4\cos^2\left(t-\frac{\pi}{6}\right)\cos^2\frac{\pi}{6}+$$

$$+\left(\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)+\sin t\right)^2=4\cos^2\left(t-\frac{\pi}{6}\right)\cos^2\frac{\pi}{6}+4\sin^2\left(t-\frac{\pi}{6}\right)\cos^2\frac{\pi}{6}=3$$

Аналогично, $|BC|=\sqrt{3}$, т.е. треугольник *ABC* равносторонний.

Далее, очевидно, что любая другая пара ***f***, ***g*** перпендикулярных векторов с длинами равными $\sqrt{3}$ и ортогональными вектору ***e***, получаются из векторов $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$ поворотом на некоторый α, т.е. $\boldsymbol{f}=\boldsymbol{e}_1\cos\alpha-\boldsymbol{e}_2\sin\alpha$ и $\boldsymbol{g}=\boldsymbol{e}_1\sin\alpha+\boldsymbol{e}_2\cos\alpha$. Но, тогда легко видеть, что координаты новых трех вершин, полученных из координат векторов ***f*** и ***g*** будут также получаться из координат вершин *A, B, C* поворотом на этот же угол α, т.е. образуют равносторонний треугольник.

Теорема доказана.

Заметим, что теорема не обобщается на случай *n*>3. В самом деле, векторы $\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}\sqrt{6}\\-\sqrt{6}\\0\\0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\\sqrt{2}\\-2\sqrt{2}\\0\end{pmatrix}$ и $\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-3\end{pmatrix}$. Поэтому, в силу леммы, точка $P(0,0)$ – решения задачи, например, для следующих наборов точек: $A_1\left(\sqrt{6},\sqrt{2}\right)$, $A_2\left(-\sqrt{6},\sqrt{2}\right)$, $A_3\left(0,-2\sqrt{2}\right)$, $A_4(0,0)$ и $A_1\left(\sqrt{6},1\right)$, $A_2\left(-\sqrt{6},1\right)$, $A_3(0,1)$, $A_4(0,-3)$. Но, точки ни одного из этих наборов не образуют правильный четырехугольник, хотя и интересны.

Литература

[1] Препарата Ф., Шеймос М., Вычислительная геометрия: Введение, – М.: Мир, 1989

[2] Рудин У., Основы математического анализа, – М.: Мир, 1966