II МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА 3 (заключительный) этап, 24-27 марта 2010 г.

Первый день.

- **1.** Занумеруем все простые числа в порядке возрастания: $p_1=2,\,p_2=3,\,\ldots$. Может ли среднее арифметическое $\frac{p_1+\ldots+p_n}{n}$ при каком-нибудь $n\geq 2$ быть простым числом?
- Швамбрании некоторые 2. В города связаны двусторонними Рейсы разделены авиарейсами. беспосадочными между авиакомпаниями, причём если какая-то авиакомпания обслуживает линию между городами А и Б, то самолёты других компаний между этими городами не летают. Известно, что из каждого города летают самолёты всех трёх компаний. Докажите, что можно, вылетев из некоторого города, вернуться в него, воспользовавшись по пути рейсами всех трёх компаний и не побывав ни в одном из промежуточных городов дважды.
- **3.** В четырехугольнике ABCD сторона AB равна диагонали AC и перпендикулярна стороне AD, а диагональ AC перпендикулярна стороне CD. На стороне AD взята точка K такая, что AC = AK. Биссектриса угла ADC пересекает BK в точке M. Найдите угол ACM.
- **4.** В вершинах куба расставили числа 1^2 , 2^2 , ..., 8^2 (в каждую из вершин по одному числу). Для каждого ребра посчитали произведение чисел в его концах. Найдите наибольшую возможную сумму всех этих произведений.

II МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА 3 (заключительный) этап, 24-27 марта 2010 г.

Второй день.

- **5.** На полке в произвольном порядке стоят десять томов энциклопедии, пронумерованных от 1 до 10. Разрешается менять местами любые два тома, между которыми стоит не меньше четырёх других томов. Всегда ли можно расставить все тома по возрастанию номеров?
- **6.** В выпуклом четырехугольнике ABCD углы B и D равны, CD = 4BC, а биссектриса угла A проходит через середину стороны CD. Чему может быть равно отношение AD/AB?
- **7.** Докажите, что для произвольных a, b, c равенство

$$\frac{a(b-c)}{b+c} + \frac{b(c-a)}{c+a} + \frac{c(a-b)}{a+b} = 0$$

выполнено тогда и только тогда, когда выполнено равенство

$$\frac{a^{2}(b-c)}{b+c} + \frac{b^{2}(c-a)}{c+a} + \frac{c^{2}(a-b)}{a+b} = 0.$$

8. Среди 100 монет есть 4 фальшивых. Все настоящие монеты весят одинаково, фальшивые — тоже, фальшивая монета легче настоящей. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь найти хотя бы одну настоящую монету?