

Задачи к первому занятию А. Скопенкова

Векторным полем на подмножестве плоскости называется семейство векторов $v(x)$ на плоскости в точках x данного подмножества, непрерывно зависящих от точки x .

Векторное поле называется *единичным*, если все его векторы единичные.

1. Постройте единичное векторное поле на плоскости. (Оно будет единичным векторным полем на произвольном подмножестве плоскости.)

Два единичных векторных поля называются *гомотопными*, если одно можно получить из другого непрерывной деформацией, в процессе которой векторное поле остается единичным. Формально, такой деформацией называется семейство v_t единичных векторных полей, непрерывно зависящее от параметра t , для которого v_0 есть первое поле и v_1 есть второе поле. Обозначим через $V(N)$ множество единичных векторных полей с точностью до гомотопности на подмножестве N плоскости.

2. (a) Любое единичное векторное поле v на плоскости гомотопно полю $-v$.

(b) Приведите пример негомотопных единичных векторных полей на некотором подмножестве плоскости.

3. $\#V(N) = 1$ для

(a) $N = 0 \times [0, 1]$;

(b) $N = D^2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$;

(c) произвольного дерева на плоскости.

4. Опишите $V(N)$ для

(a) $N = S^1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$;

(b) $N = K_4$ (граф тетраэдра);

(c) произвольного плоского графа N .

Здесь ‘описать’ означает построить ‘естественное’ взаимно-однозначное соответствие между $V(N)$ и некоторым ‘известным’ множеством. ‘Известность’ множества означает как минимум описание количества его элементов, а как максимум — наличие ‘естественных’ операций на множестве и на $V(N)$, сохраняемых соответствием.

5.* Любые два единичных векторных поля на диске D^2 , совпадающие на его граничной окружности, гомотопны *неподвижно на границе* S^1 (т.е. гомотопны так, что $v_t(x) = v_0(x)$ для $x \in S^1$).

Задачи ко второму занятию А. Скопенкова

Стандартным тором T^2 в трехмерном пространстве называется фигура, образованная вращением окружности $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ вокруг оси Oy .

Касательным векторным полем на торе T^2 называется семейство касательных к нему векторов $v(x) \in T_x$ в его точках x , непрерывно зависящих от точки x .

Будем называть единичное касательное векторное поле просто *полем*.

1. (a) Приведите пример поля на торе T^2 .

(b) Любое поле v на торе T^2 гомотопно полю $-v$.

(c) Приведите пример двух негомотопных полей на торе T^2 .

(d)* Опишите $V(T^2)$.

Понятие *единичного касательного векторного поля* на рассматриваемых ниже поверхностях вводится дословно аналогично случаю тора. Будем называть единичное касательное векторное поле просто *полем*.

Понятие *гомотопности* полей на рассматриваемых ниже поверхностях вводится дословно аналогично случаю плоскости. Обозначим через $V(N)$ множество полей на поверхности N с точностью до гомотопности (в классе полей).

Листом Мебиуса M называется поверхность в \mathbb{R}^3 , заматаемая стержнем, равномерно вращающимся относительно своего центра, при равномерном движении этого центра по окружности, при котором стержень делает пол-оборота.

2. (a) Постройте поле v на листе Мебиуса M .
- (b) Гомотопны ли построенное Вами поле v полю $-v$?
- (c) Опишите $V(M)$.

3. Опишите $V(N)$ для

- (a) верхней полусферы $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$;
- (b) кольца $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$;
- (c) боковой поверхности цилиндра $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 1\}$;
- (d) тора с дыркой;
- (e)* бутылки Клейна K (определение спросите).

4. Если на торе с дыркой заданы два поля, то их сужения на граничную окружность этой дырки гомотопны.

Рассмотрим стандартную сферу S^2 в трехмерном пространстве, т.е. подмножество точек (x, y, z) , для которых $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (или, что то же самое, точек (x, y, z) вида $(\cos \varphi \cos \psi, \sin \varphi \cos \psi, \sin \psi)$).

- 5.* (a) Не существует единичного касательного векторного поля на сфере S^2 .
- (b) То же для кренделя (определение спросите).
- (c) То же для проективной плоскости $\mathbb{R}P^2$ (определение спросите).

Задачи к третьему занятию А. Скопенкова

Единичным нормальным векторным полем к окружности $S^1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$ в трехмерном пространстве называется семейство нормальных к ней единичных векторов $v(x)$ в точках x окружности, непрерывно зависящих от точки x . Будем называть единичное нормальное векторное поле просто *нормальным полем*. Понятие *гомотопности* нормальных полей вводится дословно аналогично случаю полей.

1. (a) Постройте нормальное поле.
- (b) Постройте другое (т.е. не гомотопное уже построенному) нормальное поле.
- (c) Опишите нормальные поля с точностью до гомотопности.
- (d)* Опишите нормальные поля с точностью до гомотопности для *заузленной* гладкой окружности в \mathbb{R}^3 (определение спросите).

Неформально, *гладким вложением* $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^m$ сферы называется изображение сферы в \mathbb{R}^m без самопересечений, для которого в любой точке существует касательная плоскость. (Формально, отображение $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется *гладким вложением*, если оно инъективно и якобиан $df(x)$ невырожден для любой точки $x \in S^2$.)

Единичным нормальным векторным полем на $f(S^2)$ называется семейство нормальных к $f(S^2)$ векторов $v(x)$ в точках $f(x) \in f(S^2)$, непрерывно зависящих от точки $x \in S^2$. Будем называть единичное нормальное векторное поле просто *нормальным полем*. Аналогично определяются гладкие вложения и нормальные поля для тора, бутылки Клейна, диска и т.д.

2. (a) Любое вложение тора в \mathbb{R}^3 имеет нормальное поле.
- (b) Никакое вложение листа Мебиуса в \mathbb{R}^3 не имеет нормального поля.

3. Постройте гладкие вложения в \mathbb{R}^4

- (a) листа Мебиуса M ;
- (b) бутылки Клейна K ;
- (c)* проективной плоскости $\mathbb{R}P^2$ (определение спросите).

Постройте нормальные поля на листе Мебиуса и бутылке Клейна.

4. (a) Если гладкое вложение $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ имеет нормальное поле, то оно имеет пару линейно-независимых нормальных полей.
- (b) То же для тора.
- (c) Верно ли то же для бутылки Клейна?

Понятие *гомотопности* нормальных полей вводится дословно аналогично случаю касательных полей.

5. Опишите нормальные поля с точностью гомотопности на
(a) сфере в \mathbb{R}^4 ; (b) торе в \mathbb{R}^4 ; (c) листе Мебиуса в \mathbb{R}^4 ; (d) бутылке Кляйна в \mathbb{R}^4 .
Примечание: ответ может зависеть от гладкого вложения в \mathbb{R}^4 .

Задачи к четвертому занятию А. Скопенкова

- (a) Любое гладкое вложение диска в \mathbb{R}^4 имеет нормальное поле.
(b) То же для тора с дыркой.
(c) Верно ли то же для листа Мебиуса?
- Любое гладкое вложение тора, бутылки Клейна (или даже проективной плоскости $\mathbb{R}P^2$) в \mathbb{R}^5 имеет нормальное поле.
- Опишите нормальные поля с точностью гомотопности на
(a) сфере в \mathbb{R}^5 ; (b) торе в \mathbb{R}^5 ; (c) листе Мебиуса в \mathbb{R}^5 ; (d) бутылке Кляйна в \mathbb{R}^5 .
Примечание: ответ может зависеть от гладкого вложения в \mathbb{R}^5 .
- * (a) Любое гладкое вложение сферы в \mathbb{R}^4 имеет нормальное поле.
(b) То же для тора.
(c) Никакое гладкое вложение $f : \mathbb{R}P^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ не имеет нормального поля.
(d) Существует гладкое вложение $f : K \rightarrow \mathbb{R}^4$, не имеющее нормального поля.
- * (a) На любом трехмерном многообразии (определение спросите) существует единичное касательное векторное поле.
(b) $V(S^3) \cong \mathbb{Z}$ (умножение на $V(S^3)$ задается умножением кватернионов).